菊池郡市医師会立病院
糖尿病センターからのお知らせ

2026年
秋号③

SGLT2阻害薬


腎臓での**糖の再吸収を抑制**し、**尿中への糖排泄を促進**する薬剤

心臓・腎臓を守る効果もきたいされています

主なSGLT2阻害薬の種類（商品名）


フォシーガ®（ダパグリフロジン）	ジャディアンス®（エンパグリフロジン）	カナグル®（カナグリフロジン）	スーグラ®（イプラグリフロジン）	デベルザ®（トホグリフロジン）	ルセフィ®（ルセオグリフロジン）

SGLTの働き（腎臓の中での流れ）



SGLT2によって**糖を再吸収**して血液中に運ぶ

SGLT2阻害薬を服用したとき



糖の再吸収が抑えられ、
糖が尿中に排泄される

SGLT2阻害薬の効果

- 血糖降下作用
- 体重減少
- 血圧低下
- 心臓保護作用
- 腎臓保護作用

SGLT2阻害薬の副作用と注意

副作用に注意しましょう
・尿の回数が増える（トイレが近くなる）
・脱水（めまい、ふらつき、口の渇きなど）
　こまめに水分をとりましょう。激しい運動や長時間の入浴、飲酒のときは脱水に注意しましょう。
・尿路・性器感染症（排尿時の痛み、外陰部のかゆみ・赤みなど）
・ケトアシドーシス（吐き気、食欲不振、強いだるさ、息切れなど）（＊特に食事や水分が少ないとき、発熱時など）

症状がある場合は、すぐに医師に相談してください。
自己判断での中止はしないでください。

一般社団法人　菊池郡市医師会
菊池郡市医師会立病院　糖尿病センター

〒861-1306　熊本県菊池市大琳寺75番地3　TEL:0968-25-2191(代表)　FAX:0968-24-5762(代表)